

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka z PE z zakrętką z dozownikiem z PE

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

WODORU NADTLENEK 3%   
(*Hydrogenii peroxidum 3%*)

Syn. Woda utleniona

Roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

#### Skład

Wodoru nadtlenuk 30% 10,0 g

(stabilizowany: cynianem sodu trójwodnym,  
kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosofonowym,  
azotanem amonu,  
pirofosforanem potasu)

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Woda oczyszczona 90,0 g

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej

5g Kod EAN: 5909990035953

50g Kod EAN: 5909990035960

100g Kod EAN: 5909990035977

### 5. SPOSÓB I DROGI PODANIA

#### Sposób stosowania i droga podania

Podanie: zewnętrznie.


Do przemywania ran stosować 3% roztwór nadtlenu wodoru. Do płukania jamy ustnej lub błon śluzowych rozcieńczyć 1 łyżkę stołową preparatu (15 ml) w szklance wody (250 ml).

## **6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## **7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

### **Przeciwwskazania**

Nie stosować leku WODORU NADTLENEK 3%  jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wodoru nadtlenek.

Leku nie należy stosować w ostrych wrzodziejących zapaleniach dziąseł, gdyż może dojść do bolesnego uszkodzenia tkanek spowodowanego gwałtownym uwolnieniem tlenu.

### **Stosowanie leku u dzieci**

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności stosując lek u dzieci.


### **Ciąża i okres karmienia**

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

### **Stosowanie innych leków**

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania leku WODORU NADTLENEK 3%  z innymi lekami.

### **Możliwe działania niepożądane**

Nie odnotowano. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących działań lub objawów niepożądanych w trakcie przyjmowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

## **8. TERMIN WAŻNOŚCI**

### **Termin ważności**

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25A,

11-001 Dywity

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr IL-2844/ChF

**13. NUMER SERII**

Numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Działanie i wskazania do stosowania**

Preparat stosowany do przemywania ran jako środek bakteriobójczy. Używany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia oraz płukania kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Wodoru nadtlenek 3 %

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy