

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka z PE lub z PP z zakrętką z PE lub z PP

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

WODORU NADTLENEK 3% 
(*Hydrogenii peroxidum 3%*)

Syn. Woda utleniona

Roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

Wodoru nadtlenuk 30% 10,0 g

(stabilizowany: cynianem sodu trójwodnym,
kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym,
azotanem amonu,
pirofosforanem potasu)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Woda oczyszczona 90,0 g

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej

500g

Kod EAN: 5909990035984

5. SPOSÓB I DROGI PODANIA

Sposób stosowania i droga podania

Podanie: zewnętrznie.


Do przemywania ran stosować 3% roztwór nadtlenuku wodoru. Do płukania jamy ustnej lub błon śluzowych rozcieńczyć 1 łyżkę stołową preparatu (15 ml) w szklance wody (250 ml).

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Przeciwwskazania

Nie stosować leku WODORU NADTLENEK 3%  jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wodoru nadtlenek.

Leku nie należy stosować w ostrych wrzodziejących zapaleniach dziąseł, gdyż może dojść do bolesnego uszkodzenia tkanek spowodowanego gwałtownym uwolnieniem tlenu.

Stosowanie leku u dzieci

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności stosując lek u dzieci.


Ciąża i okres karmienia

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania leku WODORU NADTLENEK 3%  z innymi lekami.

Możliwe działania niepożądane

Nie odnotowano. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących działań lub objawów niepożądanych w trakcie przyjmowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25A,

11-001 Dywity

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-2844/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Działanie i wskazania do stosowania**

Preparat stosowany do przemywania ran jako środek bakteriobójczy. Używany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia oraz płukania kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Wodoru nadtlenek 3 %

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy